herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei är en orangeröd pilgiftsgroda på omkring 4 cm som bara är känd från Cordillera Azul på Andernas östsluttningar i Peru. Den lever i sval bergsskog på omkring 1.300-1.500 m höjd, är hotad av förlust av livsmiljö och hålls sällan. Skötseln kräver ett svalt terrarium.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Silverstone's Poison Frog Tidigare namn: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**15-16 mån.**
Ägg per läggning	**30-45**
Kläckning	**30 dagar**
Larvtid	**55-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega silverstonei*. Den bygger på klimatet i bergsskogen på omkring 1.300-1.500 m: svalt, fuktigt och stabilt året runt.
TEMPERATUR	På dagen passar 20-24 °C; 22-24 °C är den övre gränsen, och 20-21 °C är ännu bättre. På natten sänks temperaturen 3-4 °C, till omkring 17-20 °C. Temperaturen får inte överstiga 25 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-100 %: omkring 70 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll. Spraya 1-3 gånger dagligen med regnvatten eller osmosvatten, eller använd ett regnsystem och eventuellt en dimgenerator.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat vatten, och byt det ofta. Vattnet ska vara svalt, precis som luften. Lägg stenar eller grenar i skålen så att ungarna kan ta sig upp.
LJUS OCH UVB	Arten lever på skuggig skogsbotten, så ljuset ska vara måttligt, och det ska finnas skugga. Lysrör eller LED med växtvänligt spektrum i 10-12 timmar dagligen räcker.
UTFODRING	*Ameerega silverstonei* tar små till stora foderdjur: stora bananflugor (*Drosophila hydei*), nykläckta syrsor, de minsta vaxmalslarverna och håvade småinsekter från ängen. Hoppstjärtar och små gråsuggor kompletterar.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg och drar sig ofta in under löv eller korkbark. Den kan hållas i grupper, men hanarna är revirhävdande, så håll ett par eller en grupp med fler honor än hanar.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.