herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Ameerega trivittata*

*Ameerega trivittata* är en stor, dagaktiv pilgiftsgroda på 4-6 cm från Amazonas skogsbotten. Den är svart med två ljusgröna ränder längs sidorna, och hanen bär vid ett enda tillfälle ofta 15-30 grodyngel på ryggen till vatten. Grodan kräver ett rymligare terrarium än de små pilgiftsgrodorna.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Three-striped Poison Frog  Tidigare namn: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*  Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **4-6 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog och våtmark** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **70 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **23-25 °C** |
| Temperatur, natt | **19-22 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Könsmogen | **12-24 mån.** |
| Ägg per läggning | **15-40** |
| Kläckning | **15-22 dagar** |
| Larvtid | **40-90 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Ett terrarium på minst 70 × 50 × 50 cm (längd, bredd, höjd) passar för två vuxna *Ameerega trivittata*. |
| **TEMPERATUR** | Dagtemperaturen hålls på 23-25 °C, och på natten sänks den med 3-4 °C till omkring 19-22 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska ligga på 80-90 % större delen av dagen, nära 100 % morgon och kväll, och den får sjunka till omkring 70 % mitt på dagen. Längre tid under 70 % är farligt, särskilt om grodan inte har tillgång till vatten. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Skålen ska vara så låg att en unge kan ta sig upp ur den, och med sten eller mossa i kanten. Skål och vatten byts ofta, och skålen rengörs med varmt vatten utan tvål. |
| **LJUS OCH UVB** | UVB är inte dokumenterat som nödvändigt för pilgiftsgrodor i allmänhet, och för just den här arten finns inga uppgifter. En svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) är valfri. |
| **UTFODRING** | Kosten består av små levande leddjur. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | Hanarna kallar högljutt och försvarar små revir, medan honorna är lugna. Det är inte dokumenterat hur arten beter sig i grupper i fångenskap, så par är det säkraste sättet att hålla dem. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Bolivia, Brasilien, Colombia, Guyana, Peru, Surinam och Venezuela. |