herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates bombetes

Andinobates bombetes är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-19 mm från molnskogarna i Colombias Anderna. Den är svart till mörkbrun med röda eller orange teckningar på framkroppen och är beroende av vattenfyllda bromelior. Arten är sårbar i naturen, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Cauca Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya bombetes; Dendrobates bombetes; Minyobates bombetes*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H för 5 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-112 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates bombetes*. Den bygger på livsmiljön, en sval och mycket fuktig bergsskog med tjockt lövlager och bromelior, och på uppfödning i fångenskap i Colombia.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C, och på natten får den gärna sjunka till 18-21 °C som i bergsskogen. Håll temperaturen under 27 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 % och aldrig under 70 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Det behövs ingen vattenskål; grodorna dricker droppar från växter och sprayvatten. Till grodynglen används bromelior med vatten i bladvecken eller små plastbägare med 2-3 cm vatten.
LJUS OCH UVB	Ljuset är först och främst till för växterna: växtljus i 10-12 timmar om dagen ger dygnsrytm och tillväxt.
UTFODRING	Fodret är små leddjur: hoppstjärtar, små bananflugor (*Drosophila melanogaster*), små gråsuggor och nykläckta syrsor. Nymetamorfoserade ungar tar bara hoppstjärtar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Andinobates bombetes* är dagaktiv och håller sig lågt i terrariet, i lövlagret och vid bromeliorna. Hanarna kallar framför allt på morgonen.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.