herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae beskrevs som den minsta pilgiftsgrodan: vuxna djur mäter bara omkring 13 mm. Den lever i lövstreckan i låglandsskog i Bocas del Toro i nordvästra Panama, både på öarna och på fastlandet. Arten är hotad, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Bocas Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya claudiae* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Expert**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Andinobates claudiae*. Skötseln bygger på livsmiljön: varm, fuktig låglandsskog med regn större delen av året och ett tjockt lövskikt.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C och natten 19-22 °C. Siffrorna är lånade från *Ranitomeya imitator*, som trivs bäst vid 21-24 °C och tål 18-27 °C. Över 29 °C är farligt, så terrariet får inte stå i sol eller nära en värmekälla.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya terrariet 1-2 gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten så att lövet hålls fuktigt, eller använd ett regnsystem på timer. Botten ska vara fuktig men aldrig stå under vatten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	De vuxna grodorna behöver ingen vattenskål; de får vatten genom huden från sprayningen och det fuktiga lövet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och lever i skugga på skogsbotten. LED-belysning i omkring 12 timmar om dagen räcker för växterna. UVB behövs inte; ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 kan användas om det finns gott om skugga.
UTFODRING	*Andinobates claudiae* är så liten att foderdjuren måste vara de minsta som finns: hoppstjärtar, små vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor. Även vanliga bananflugor kan vara för stora.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och håller sig i lövstreckan och vid gömställena. Hanarna kallar från fasta platser och försvarar sitt område, så hållningsformen är ett par. Flera hanar i samma terrarium ger stress och slagsmål.
NATURLIG UTBREDNING	Panama.