herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates daleswansoni

Andinobates daleswansoni är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 18-20 mm med knallrött huvud och framkropp och brun bakkropp. Den finns bara i molnskogen på Cordillera Central i Caldas i Colombia. Arten är hotad och hålls knappast, så skötseln bygger på livsmiljöns svala, våta bergsklimat.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Samaná Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya daleswansoni* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**14-17 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-152 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates daleswansoni*, och arten hålls knappast i fångenskap. Skötseln bygger på livsmiljön: sval, våt molnskog med tjockt lövskikt, många gömställen och bromelior.
TEMPERATUR	Temperaturen har inte mätts i artens livsmiljö. 18-22 °C på dagen och 14-17 °C på natten passar för molnskog på 1.800-2.500 m höjd. Arten tål värme dåligt, och längre tid över 25 °C belastar djuren.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 85-100 %. Spraya löv och växter ordentligt en eller två gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten, eller använd ett dimsystem på timer. Botten ska vara fuktig men inte stående blöt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska inte ha någon vattendel. Djuren får fukt från löv, växter och sprayning. Grodynglen växer upp i vatten i bromeliornas bladtrattar.
LJUS OCH UVB	Ge 10-12 timmars ljus om dagen från LED, så att växterna trivs. Molnskogens undervegetation är skuggig, så ljuset ska inte vara starkt, och djuren ska kunna söka skugga.
UTFODRING	*Andinobates daleswansoni* mäter bara 18-20 mm och äter små leddjur som hoppstjärtar och små bananflugor. Ge foder varannan dag, pudra foderdjuren med kalk de flesta gångerna och med vitaminer med D3 1 gång i veckan.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och lever på marken i lövstreckan, där den använder hål och gömställen. Revirbeteende och läten har inte dokumenterats. Ett par kan hållas tillsammans i ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/andinobates-daleswansoni