herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates dorisswansonae

Andinobates dorisswansonae är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-19 mm, svart eller mörkbrun med röda, orange eller gula fläckar. Den är bara känd från en liten skogsbit i norra Tolima i Colombia. Arten är sårbar och hålls knappast, så skötseln bygger på livsmiljöns svala, våta bergsklimat.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Tolima Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya dorisswansonae* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-152 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**14-17 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates dorisswansonae*, och arten hålls knappast i fångenskap. Skötseln bygger på livsmiljön: sval, våt bergsskog med tätt kronskikt, tjockt lövskikt och bromelior.
TEMPERATUR	Temperaturen har inte mätts i artens livsmiljö. 18-22 °C på dagen och 14-17 °C på natten passar för skog på omkring 1.800 m höjd. Arten tål värme dåligt, och längre tid över 25 °C belastar djuren.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 85-100 %. Spraya löv och växter ordentligt en eller två gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten, eller använd ett dimsystem på timer. Botten ska vara fuktig men inte stående blöt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska inte ha någon vattendel. Djuren får fukt från löv, växter och sprayning. Grodynglen växer upp i vatten i bromeliornas bladtrattar.
LJUS OCH UVB	Ge 10-12 timmars ljus om dagen från LED, så att växterna trivs. Skogen har tätt kronskikt, så ljuset ska inte vara starkt, och djuren ska kunna söka skugga.
UTFODRING	*Andinobates dorisswansonae* mäter bara 16-19 mm och äter små leddjur, i naturen främst myror.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och lever på marken i lövstreckan. Revirbeteende har inte dokumenterats. Ett par kan hållas tillsammans i ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm. Grodorna bör inte hanteras, eftersom huden är känslig.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/andinobates-dorisswansonae