herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates minutus

Andinobates minutus är en av de minsta pilgiftsgrodorna, bara 13-16 mm från nos till kloak. Den lever i lövstrecken i fuktig låglandsskog från centrala Panama till Colombias stillahavskust, och hanen bär grodynglen upp i bromelior. Arten samlas inte in för djurhandel och hålls knappast, så det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Blue-bellied Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates minutus*. Skötseln bygger på livsmiljön: varm, fuktig låglandsskog med regn större delen av året och ett tjockt lövskikt.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C och natten 19-22 °C. Siffrorna är lånade från *Ranitomeya imitator*, som trivs bäst vid 21-24 °C och tål 18-27 °C. Över 29 °C är farligt, så terrariet får inte stå i sol eller nära en värmekälla.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya terrariet 1-2 gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten så att lövet hålls fuktigt, eller använd ett regnsystem på timer. Botten ska vara fuktig men aldrig stå under vatten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	De vuxna grodorna behöver ingen vattenskål; de får vatten genom huden från sprayningen och det fuktiga lövet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och lever i skugga på skogsbotten. LED-belysning i omkring 12 timmar om dagen räcker för växterna. UVB behövs inte; ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 kan användas om det finns gott om skugga.
UTFODRING	I naturen lever *Andinobates minutus* på kvalster, myror, hoppstjärtar och insektslarver.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och håller sig i lövstrecken och vid gömställena. Hanarna kallar från fasta platser och försvarar sitt område, så hållningsformen är ett par. Flera hanar i samma terrarium ger stress och slagsmål.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia och Panama.