herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 15-20 mm från Colombias Anderna, där den lever i lövstrecken i fuktig bergsskog i Antioquia och Caldas. Arten är sårbar i naturen, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Andean Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-112 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H för 5 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Andinobates opisthomelas*, och arten hålls knappast. Skötseln bygger på livsmiljön, den svala och fuktiga bergsskogen med lövskikt och bromelior, och på nära släktingar.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C, och på natten får den gärna sjunka till 18-21 °C som i bergsskogen. Håll temperaturen under 27 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 % och aldrig under 70 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Det behövs ingen vattenskål; grodorna dricker droppar från växter och sprayvatten. Till grodynglen används bromelior med vatten i bladvecken eller små plastbägare med 2-3 cm vatten.
LJUS OCH UVB	Ljuset är främst till för växterna: växtljus i 10-12 timmar om dagen ger dygnsrytm och tillväxt. UVB behövs knappast, men en svag UVB-ljuskälla (zon 1) över en del av terrariet skadar inte när det finns skugga under växterna.
UTFODRING	Fodret är små leddjur: hoppstjärtar, små bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor. Nyförvandlade ungar tar bara hoppstjärtar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Andinobates opisthomelas* är dagaktiv och lever på marken, så den håller sig lågt i terrariet, i lövstreckan och vid bromeliorna.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.