herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-19 mm med brun rygg och metallglänsande gulbronsfärgat huvud. Den är bara känd från en liten bit molnskog i norra Tolima i Colombia, beskrevs först 2007 och hålls knappast. Skötseln bygger därför på livsmiljöns svala, fuktiga bergsklimat.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-152 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates tolimensis*, och arten hålls knappast i fångenskap. Skötseln bygger på livsmiljön: sval, fuktig molnskog med tätt lövskikt, mossa, dött trä och bromelior.

TEMPERATUR
Temperaturen har inte mätts i artens livsmiljö. 19-23 °C på dagen och 15-19 °C på natten passar för molnskog på omkring 1.800 m höjd.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara 85-100 % hela året, och lövskiktet ska vara konstant fuktigt. Spraya minst två gånger om dagen eller använd ett dimsystem, och låt ytorna torka lite mellan sprayningarna så att mögel inte uppstår.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Arten ska inte ha någon vattendel. Vattnet finns i bromeliornas bladtrattar, där grodynglen växer upp, och det ska bytas regelbundet så att det inte blir grumligt. Använd osmosvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten.

LJUS OCH UVB
A. tolimensis lever i en tät skog med lite ljus vid marken, så ljuset är främst till för växterna. Ge 10-12 timmars ljus om dagen med LED eller lysrör och mörker på natten. Det har inte dokumenterats att arten behöver UVB.

UTFODRING
Fodret är små leddjur: de minsta hoppstjärtarna och bananflugorna (*Drosophila*) och små gråsuggor. Mata 3-4 gånger i veckan, och låt det alltid finnas levande foderdjur i terrariet.

BETEENDE OCH HANTERING
Beteendet i fångenskap har inte dokumenterats. Grodan lever på skogsbotten i skugga och gömmer sig i hål mellan rötterna, i löv och mossa. Hanen kallar från marken.

NATURLIG UTBREDNING
Colombia.