herpy

PILGIFTSGRODOR

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på upp till 19 mm med scharlakansrött huvud och framkropp och brun bakkropp. Den finns bara i molnskogen på den östra Andernas bergskedja i Colombia. Arten är sårbar i naturen och hålls knappast, så skötseln bygger på livsmiljöns svala, fuktiga bergsklimat.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Santander Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-152 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates virolinensis*, och arten hålls knappast i fångenskap. Skötseln bygger på livsmiljön: sval, fuktig molnskog med tjockt lövskikt och bromelior.
TEMPERATUR	Temperaturen har inte mätts i artens livsmiljö. 19-23 °C på dagen och 15-19 °C på natten passar för molnskog på 1.300-2.400 m höjd.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 85-100 % med ett fuktigt lövskikt hela året.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska inte ha någon vattendel. Vattnet finns i bromeliornas bladtrattar, där grodynglen växer upp, och det ska bytas regelbundet så att det inte blir grumligt. Använd osmosvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten.
LJUS OCH UVB	*A. virolinensis* lever på skogsbotten i skugga, så ljuset är främst till för växterna. Ge 10-12 timmars ljus om dagen med LED eller lysrör och mörker på natten. Det har inte dokumenterats att arten behöver UVB.
UTFODRING	Fodret är små leddjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila*) i minsta storlek och små gråsuggor. Mata 3-4 gånger i veckan, och låt det alltid finnas levande foderdjur i terrariet.
BETEENDE OCH HANTERING	Beteendet i fångenskap har inte dokumenterats. I naturen delar flera vuxna samma bromelia, så arten tål troligen sällskap och kan hållas i par eller en liten grupp.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.