herpy

PILGIFTSGRODOR

Epipedobates boulengeri

Epipedobates boulengeri är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på omkring 17-24 mm med mörkbrun rygg och en hel, ljus strimma längs sidan. Den lever i låglandsregnskogen längs Stillahavskusten från sydvästra Colombia till nordvästligaste Ecuador. Arten hålls knappast, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Marbled Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates boulengeri; Phyllobates boulengeri* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-24 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**10-30**
Kläckning	**9-14 dagar**
Larvtid	**42-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Epipedobates boulengeri*, och arten hålls knappast.
TEMPERATUR	Håll 22-26 °C på dagen med lite svalare och lite varmare platser i terrariet, och 19-22 °C på natten. Det klaras normalt med rumstemperatur och belysningen; värmemattor är onödiga.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya flera gånger om dagen eller använd ett regnsystem, t.ex. tre gånger dagligen i 20-60 sekunder, gärna kompletterat med en dimmaskin.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En platt vattenskål med 1-2 cm vatten, t.ex. ett lågt fat eller ett halvt paranötsskal, ger grodorna en plats att dricka och bada och är en förökningsplats när hanen ska sätta av grodyngel. Skålen ska vara lätt att ta sig upp ur.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till för växterna: lysrör eller LED-lister i omkring 12 timmar om dagen. De närbesläktade arterna trivs utan UVB, så det är valfritt. Vill man ge det, håll sig till Fergusonzon 1 med gott om skugga och tätt lövverk.
UTFODRING	Grodorna får levande, små bytesdjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och vuxna tar dessutom den större *Drosophila hydei* och nykläckta syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	Släktets arter är dagaktiva, markbundna och revirhävdande, och hanarna ropar från fasta platser. Lätet är inte närmare beskrivet för *E. boulengeri* i snäv mening.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia och Ecuador.