herpy

PILGIFTSGRODOR

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei är en liten, svart pilgiftsgroda på 13-20 mm med orange till gula fläckar. Den lever i bergsskogen runt Mindo i nordvästra Ecuador och är hotad. Sedan 2024 räknas den som synonym till *Epipedobates espinosai*. Det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Darwin Wallace poison frog Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**10-30**
Kläckning	**9-14 dagar**
Larvtid	**42-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattendel** djup 2-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Epipedobates darwinwallacei*, och arten hålls knappast.
TEMPERATUR	Håll 20-24 °C på dagen och 18-20 °C på natten. Det motsvarar den svala änden av vad som passar *Epipedobates tricolor* från samma höjd. Det klaras normalt med rumstemperatur och belysningen.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya flera gånger om dagen eller använd ett regnsystem, t.ex. tre gånger dagligen i 20-60 sekunder, gärna kompletterat med en dimmaskin.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ge en liten, fast vattendel med 2-5 cm vatten och en mjuk sluttning eller ramp, så att grodorna lätt tar sig upp.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till för växterna: lysrör eller LED-lister i omkring 12 timmar om dagen. De närbesläktade arterna trivs utan UVB, så det är valfritt. Vill man ge det, håll sig till Fergusonzon 1 med gott om skugga och tätt lövverk.
UTFODRING	Grodorna får levande, små bytesdjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och vuxna tar dessutom den större *Drosophila hydei* och nykläckta syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	*E. darwinwallacei* är dagaktiv och rör sig öppet mellan gräs och löv. Lätet liknar mycket lätet hos de bruna *E. espinosai* från låglandet. Släktets hanar är revirhävdande och ropar från fasta platser.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador.