herpy

PILGIFTSGRODOR

Epipedobates machalilla

Epipedobates machalilla är en smal, dämpat färgad pilgiftsgroda på 14-18 mm med brun rygg och en ljus strimma längs sidan. Den lever bara i låglandet och de torra skogarna i västra Ecuador. Arten hålls knappast, och skötseln bygger på klimatet och de nära släktingarna.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Machalilla poison frog Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14-18 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**15**
Kläckning	**18-22 dagar**
Larvtid	**42-70 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Epipedobates machalilla*, och arten hålls knappast.
TEMPERATUR	Håll 22-27 °C på dagen med lite svalare och lite varmare platser i terrariet, och 19-22 °C på natten. Arten lever lägre och varmare än *Epipedobates tricolor*, så den övre delen av intervallet passar.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya flera gånger om dagen eller använd ett regnsystem, t.ex. tre gånger dagligen i 20-60 sekunder, så att blad och inredning är torra igen efter omkring en timme.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten, som grodorna lätt tar sig upp ur, räcker. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat kranvatten, och byt det ofta.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till för växterna: lysrör eller LED-lister i omkring 12 timmar om dagen. De närbesläktade arterna trivs utan UVB, så det är valfritt. Vill man ge det, håll sig till Fergusonzon 1 med gott om skugga och tätt lövverk.
UTFODRING	*Epipedobates machalilla* är liten och tar små bytesdjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och som vuxen också den större *Drosophila hydei* och nykläckta syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	Hanarna är sannolikt revirhävdande och ropar från sittplatser på marken och i lövskiktet, liksom de nära släktingarna. Arten hålls bäst som ett par eller en liten grupp i ett terrarium med många siktbarriärer och gömställen.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador.