herpy

PILGIFTSGRODOR

Excidobates captivus

Excidobates captivus är en mycket liten, dagaktiv pilgiftgroda på 12-17 mm från gränsområdet mellan Peru och Ecuador. Den är svart med orangeröda fläckar i rader längs ryggen och gula fläckar på lemmar och buk, och den lever på skogsbotten i fuktig regnskog och bergsskog.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Rio Santiago Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates captivus; Ranitomeya captiva; Adelphobates captivus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**4-8**
Larvtid	**65-75 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Excidobates captivus*. Arten lever på skogsbotten i varm till mild, ständigt fuktig skog.
TEMPERATUR	Temperaturen på artens lokaler är inte uppmätt. 22-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten ligger mellan klimatet i låglandet och på 800-1200 m höjd. Små pilgiftgrodor tål värme dåligt, så undvik längre perioder över 28 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %, och bottensubstratet ska vara fuktigt hela året. Spraya med osmos- eller regnvatten en till två gånger dagligen, eller använd ett regn- eller dimsystem. Se till att luften inte står stilla.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål är inte nödvändig, eftersom grodorna får fukt från sprayningen och det fuktiga lövlagret. Vattnet i bromelior och filmburkar byts med friskt osmos- eller regnvatten varje vecka.
LJUS OCH UVB	Arten lever i skugga på skogsbotten, så ljuset ska först och främst ge växttillväxt och en dag på 12 timmar. UVB är inte nödvändigt, men valfritt.
UTFODRING	*Excidobates captivus* är så liten att den bara kan ta mycket små foderdjur: hoppstjärtar, vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och de minsta gråsuggorna. Mata vuxna och ungar dagligen med så mycket som blir uppätet.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv, men gömmer sig mycket i lövverket. Hanen ropar korta, gälla ljud från dolda platser. Den hålls bäst som par, eftersom flera djur tillsammans kan ge strid.
NATURLIG UTBREDNING	Peru och Ecuador.