herpy

PILGIFTSGRODOR

Excidobates mysteriosus

Excidobates mysteriosus är en liten, dagaktiv pilgiftgroda på omkring 3 cm från Cordillera del Cóndor i norra Peru. Den är svart med vita prickar, fortplantar sig i vattenfyllda bromelior i gammal bergsskog och är hotad i naturen.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Marañón Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates mysteriosus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**10-12 mån.**
Ägg per läggning	**4-8**
Larvtid	**65-75 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Excidobates mysteriosus*. Djuren lever i fuktig bergsskog nära bromelior och klippor, med varma dagar och svala nätter.
TEMPERATUR	Temperaturen på artens lokaler är inte uppmätt. 21-25 °C på dagen och 17-20 °C på natten passar klimatet i förbergen. Grodorna tål värme dåligt, så undvik längre perioder över 27 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %, och bottensubstratet ska vara fuktigt hela året. Spraya med osmos- eller regnvatten en till två gånger dagligen, eller använd ett regn- eller dimsystem.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål är inte nödvändig, eftersom grodorna får fukt från sprayningen och från de vattenfyllda bromeliorna. Vattnet i bromelior och filmburkar byts med friskt osmos- eller regnvatten varje vecka.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och lever i skugga under tätt lövverk, så ljuset ska först och främst ge växttillväxt och en dag på 12 timmar. UVB är inte nödvändigt, men valfritt.
UTFODRING	*Excidobates mysteriosus* är stor nog att ta vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och, när djuren är vuxna, *Drosophila hydei*. I naturen äter arten myror och små flugor.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv, och hanen ropar högt och ofta från växterna och klipporna i terrariet. Den hålls bäst som par, eftersom flera djur tillsammans kan ge strid. Grodorna bör inte hanteras, eftersom de är känsliga för stress.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.