herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Hyloxalus azureiventris*

*Hyloxalus azureiventris* är en dagaktiv pilgiftsgroda på 25-28 mm, svart med gula ränder, blågrön marmorering och lysande blå teckningar på benen och undersidan. Arten finns bara i ett litet område i norra Peru och är klassificerad som hotad. Den är sällsynt i terrariehobbyn och kräver en erfaren hållare, men kan fortplantas i fångenskap.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Sky-blue Poison Frog  Tidigare namn: *Cryptophyllobates azureiventris; Phyllobates azureiventris*
Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **25-28 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **5-10 år** |
| Aktiv | **På dagen och i skymningen** |
| Levnadssätt | **Klipplevande och marklevande** |
| Biotop | **Regnskog och klippterräng** |
| Hudgift | **Inget känt** |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **24-26 °C** |
| Temperatur, natt | **20-23 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **10-17** |
| Kläckning | **12-14 dagar** |
| Larvtid | **42 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Starkt hotad (EN)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm (längd, bredd, höjd) passar för ett par *Hyloxalus azureiventris*. Arten lever på marken, så bottenytan betyder mer än höjden. |
| **TEMPERATUR** | Håll *Hyloxalus azureiventris* på 24-26 °C på dagen, och låt temperaturen sjunka 3-4 °C på natten, till omkring 20-23 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten får inte länge ligga under 70-80 %. Morgon och kväll ska den upp på nästan 100 % med dimma eller regn, medan den gärna får sjunka till omkring 70 % mitt på dagen. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | Arten behöver en liten, grund vattenskål för dricksvatten och som möjlig förökningsplats. Använd en skål med 1-2 cm vatten och platt kant, så att grodorna kan ta sig in och ut, och så att ingen drunknar. |
| **LJUS OCH UVB** | Något behov av UVB är inte dokumenterat hos arten. En svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) kan användas som valfritt tillskott, om djuren har möjlighet att söka sig bort från den. |
| **UTFODRING** | *Hyloxalus azureiventris* behöver små, levande bytesdjur. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Hyloxalus azureiventris* är dagaktiv och lever dolt bland stenar, rötter och löv. Vuxna djur är mycket aggressiva mot artfränder av samma kön: både hanar och honor hoppar på varandra och klamrar sig fast. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Peru. |