herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Oophaga histrionica*

*Oophaga histrionica* är en dagaktiv pilgiftsgroda på 3-4 cm från regnskogen i västra Colombia, brun till svart med stora orange fläckar. Grodynglen lever uteslutande av obefruktade ägg som honan lägger åt dem, och det gör arten till en av de svåraste pilgiftsgrodorna att föda upp. Den är akut hotad, och artens avgränsning ändrades 2018.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Harlequin Poison Frog  Tidigare namn: *Dendrobates histrionicus*  Publicerad 15 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **3-4 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **9 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Expert** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **24-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Könsmogen | **12 mån.** |
| Ägg per läggning | **4-20** |
| Kläckning | **10 dagar** |
| Larvtid | **90 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Obefruktade ägg från honan** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Akut hotad (CR)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Siffrorna här gäller det gamla, breda komplexet. Ett par behöver ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm, och större är bättre. |
| **TEMPERATUR** | Dagtemperaturen ska ligga på 24-26 °C, och på natten sänks den 5-6 grader, till 18-21 °C. Temperaturen behöver bara variera 1-2 grader över året, och det finns ingen vintervila. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll. Det klaras lättast med ett regnsystem och ett dimsystem på timer. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål med omkring 1 cm vatten och en ramp av sten eller mossa räcker för de vuxna. Använd osmosvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten, och byt vattnet ofta. |
| **LJUS OCH UVB** | Ljuset är framför allt till för bromelior och andra växter. Ge omkring 12 timmars ljus om dagen med LED eller lysrör som inte värmer mycket. |
| **UTFODRING** | *Oophaga histrionica* äter små leddjur, i naturen framför allt myror, termiter, kvalster och små skalbaggar. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Oophaga histrionica* är dagaktiv. Hanen ropar från en låg sittplats, och hanarna försvarar sina revir. Håll därför bara ett par i terrariet. Hantera inte grodorna. Huden är känslig, och djuren stressas lätt. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Colombia. |

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/oophaga-histrionica