herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Oophaga pumilio*

*Oophaga pumilio* är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-24 mm från Centralamerikas regnskogar, känd för sina många färgformer och en ovanlig yngelvård: honan matar varje grodyngel med obefruktade ägg. Den är fascinerande att följa, men kräver erfarenhet, små foderdjur och tålamod.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Strawberry Poison Frog  Tidigare namn: *Dendrobates pumilio*  Publicerad 15 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **17-24 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **10-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H för 4 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **22-26 °C** |
| Temperatur, natt | **19-21 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1 cm |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Könsmogen | **10 mån.** |
| Ägg per läggning | **3-5** |
| Kläckning | **10-14 dagar** |
| Larvtid | **42-56 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Obefruktade ägg från honan** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Ett par behöver ett högt terrarium på minst ca 38 liter, och upp till fyra djur ca 76 liter. Ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm (ca 90 liter) är därför ett bra minimum för en liten grupp. |
| **TEMPERATUR** | Dagstemperaturen ska ligga på 22-26 °C och natten på 19-21 °C. Ytterpunkterna är 20-29 °C, med ca 24 °C på dagen och en sänkning till omkring 20 °C på natten. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska vara hög, 70-100 %. Sikta på 70-80 % på dagen och upp mot 100 % på natten, till exempel genom att spraya fyra gånger om dagen med en automatisk anläggning. En regnanläggning med timer är därför en stor fördel. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål räcker, men vattnet får högst vara ca ¾ av grodans höjd, i praktiken under 1 cm, för arten simmar dåligt och kan drunkna. Använd en platt skål med en ramp av sten eller mossa och byt vattnet ofta. |
| **LJUS OCH UVB** | Ge 12 timmars ljus per dag, så att växterna trivs. En LED-växtlampa som inte värmer mycket är ett bra val. |
| **UTFODRING** | *Oophaga pumilio* behöver mycket små foderdjur, högst ca 2 mm. Små, vinglösa *Drosophila melanogaster* och hoppstjärtar är basfodret, kompletterat med bladlöss, termiter och andra små foderdjur. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Oophaga pumilio* är dagaktiv, djärv och nyfiken och rör sig mycket i lövet. Hanarna försvarar revir med ett surrande, syrsliknande lockläte och kan slåss med andra hanar. Honorna väljer typiskt den närmaste lockande hanen. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Nicaragua, Costa Rica och Panama. |

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/oophaga-pumilio