herpy

PILGIFTSGRODOR

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor är en gul till orange pilgiftsgroda på 3-5 cm från regnskogen i västra Colombia, ofta med svarta eller grönaktiga ben. I naturen är den ett av de giftigaste djur man känner till, men uppfödda djur är ogiftiga. Den är djärv, nyfiken och nästan alltid framme, och den förökar sig villigt i terrariet.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Black-legged Poison Dart Frog Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-5 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**4,5 g**
Livslängd	**6-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12 mån.**
Ägg per läggning	**4-30**
Kläckning	**13-14 dagar** vid 21-23 °C
Larvtid	**21-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *Phyllobates bicolor* behöver ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm.
TEMPERATUR	Uppgifterna för dagtemperaturen varierar från 21-23 °C till 23-26 °C, så 21-25 °C är en säker ram. På natten sänks temperaturen 3-4 grader, till 18-21 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll. Ett regnsystem och ett dimsystem på timer gör det lättast, och dimman får tydligt grodorna att ropa och röra sig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten uppskattar en vattenyta i terrariet. Ge en eller flera små vattenskålar med 1-2 cm vatten som djuren lätt kommer upp ur, eller en liten vattendel framför rutan med avlopp, så att vattnet lätt kan bytas.
LJUS OCH UVB	Ljuset är framför allt till för växterna. Lysrör eller LED i omkring 12 timmar om dagen räcker.
UTFODRING	*Phyllobates bicolor* föredrar små foderdjur på högst omkring 3 mm.
BETEENDE OCH HANTERING	*Phyllobates bicolor* är dagaktiv, mycket aktiv och nyfiken och nästan alltid synlig. Hanarna ropar högt med drillande, surrande toner, ibland i flera dagar i sträck.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.