herpy

PILGIFTSGRODOR

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis är den största av pilgiftsgrodorna, 4-5 cm, och i naturen ett av de giftigaste djur man känner till. Den lever bara i en liten bit regnskog vid Colombias Stillahavskust. Uppfödda djur är praktiskt taget ogiftiga, djärva och alltid framme, och arten har blivit en av terraristikens mest hållna pilgiftsgrodor.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Golden Poison Frog Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**16-20 mån.**
Ägg per läggning	**10-30**
Kläckning	**10-25 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**30-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par *Phyllobates terribilis* behöver ett terrarium på minst 50 × 50 × 50 cm, gärna 60 cm i alla mått, och 60 × 50 × 80 cm eller 80 × 50 × 80 cm till grupper på 5-10 djur.

TEMPERATUR
Uppgifterna varierar: 16-27 °C med omkring 21-24 °C som idealiskt, 18-24 °C på dagen och ner till 16 °C på natten och aldrig över 27 °C, eller 22-24 °C nere vid botten och 30-32 °C i de högsta, mest utsatta zonerna under en liten spot på till exempel 35 W, men inte över 30 °C i hela terrariet.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara hög, 70-100 %, men botten får inte bli sumpig. En regnanläggning är det enklaste, till exempel med tre sprayningar om dagen på 20-60 sekunder, beroende på dysorna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Ge en eller flera små vattenskålar med omkring 2 cm vatten, till exempel underfat eller halva paranötsskal, som djuren lätt kommer upp ur.

LJUS OCH UVB
Ljuset är först och främst till för växterna. Lysrör eller LED-lister i omkring 12 timmar om dagen räcker, och dagslängden får gärna variera lite över året.

UTFODRING
Phyllobates terribilis tar större byten än de flesta pilgiftsgrodor. I naturen är myror huvudfödan, men den tar många slags små leddjur.

BETEENDE OCH HANTERING
Phyllobates terribilis är dagaktiv, djärv och nyfiken och är framme största delen av dagen med en kort paus mitt på dagen. Hanarna lockar med en mjuk, fågellik drill, särskilt efter sprayning.

NATURLIG UTBREDNING
Colombia.