herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica är en pytteliten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-19 mm från Amazonas omkring Iquitos i Peru och Leticia i Colombia. Den är svart med röda, orange eller gula ränder och blågrå marmorering på benen, förökar sig i bromelior och räknas som en av de lättaste små Ranitomeya att hålla och föröka.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Amazonian Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates amazonicus* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**2-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och andra grodyngel**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par eller en trio *Ranitomeya amazonica* kan hållas i ett terrarium på 40 × 40 × 40 cm. Uppgifterna varierar från 30 × 30 × 30 cm för 2-3 vuxna till ca 45 × 45 × 45 cm för 1-3 djur.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Arten tål 18-27 °C, trivs bra omkring 21-24 °C och är mest aktiv och förökar sig bäst vid 24-26 °C. Över 27 °C blir grodorna stressade, och 29 °C kan vara dödligt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %, helst 80-100 %. Spraya varje dag, gärna morgon och kväll, så att fukten ligger nära 100 % efter sprayningen och sjunker till omkring 70-75 % mitt på dagen. Använd osmosvatten eller regnvatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ranitomeya amazonica simmar dåligt, så vattnet ska vara grunt och lätt att ta sig upp ur.

LJUS OCH UVB

Grodorna är dagaktiva och lever i skogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: ge 12-14 timmar LED-växtljus per dag. *Ranitomeya amazonica* har inget känt behov av UVB, så UVB är valfritt.

UTFODRING

Ranitomeya amazonica är så liten att den bara kan ta små foderdjur. Ungar och vuxna tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta *D. hydei* och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

Ranitomeya amazonica är dagaktiv, men ofta skygg, och särskilt unga djur gömmer sig mycket. I ett tätt planterat terrarium med många vissna blad kommer grodorna mer fram.

NATURLIG UTBREDNING

Peru och Colombia.