herpy

PILGIFTSGRODOR

# *Ranitomeya benedicta*

*Ranitomeya benedicta* är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-20 mm från låglandsskogen i norra Peru. Det klart röda huvudet och den svarta kroppen med blått nätmönster gör den till en av de mest färgstarka i släktet. Fram till 2008 räknades den som en underart av *Ranitomeya fantastica*. I naturen är den sårbar, men uppfödda djur förökar sig villigt i ett väl inrett terrarium.

Familj: Dendrobatidae  Engelska: Blessed Poison Frog  Publicerad 15 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **16-20 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **5-10 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Trädlevande och marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **2-6** |
| Kläckning | **10-14 dagar** |
| Larvtid | **60-114 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Vaktar äggen och bär grodynglen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **21-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt** |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Ett par *R. benedicta* kan hållas i ett terrarium på 40 × 40 × 40 cm. |
| **TEMPERATUR** | Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Arten trivs bäst omkring 21-24 °C och tål kortvarigt 18-27 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet torkar upp lite mellan sprayningarna. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. |
| **LJUS OCH UVB** | *R. benedicta* är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus per dag med lysrör eller LED på timer, året runt, och mörker på natten. Det motsvarar daglängden i tropikerna. |
| **UTFODRING** | Basfodret är små levande leddjur. Djur i alla åldrar tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och vuxna kan också ta den större *D. hydei*. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *R. benedicta* är dagaktiv och kan vara lite skygg, särskilt som ung, men i ett tätt planterat terrarium med gömställen syns vuxna djur mycket. Hanen sitter fritt framme och lockar. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Peru. |