herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata är en av de minsta arterna i släktet: bara 15-17 mm från nos till kloak. Den är skarpt gul med svart teckning, bruna ben och ljusblå buk och kommer från regnskogen nära Iquitos i nordöstra Peru. Den är dagaktiv och lite skygg, förökar sig villigt i filmburkar och bromelior och är ett bra val för en hållare med lite erfarenhet.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Tahuayo Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates flavovittatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**2-6**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. flavovittata* kan hållas i ett terrarium på 30 × 30 × 45 cm, och samma storlek kan rymma 2-3 vuxna djur. Andra uppgifter rekommenderar 45 × 45 × 45 cm för 1-3 grodor och omkring 20 liter per groda i en grupp.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Arten trivs bäst omkring 21-24 °C och tål 18-27 °C. Nattemperaturen är inte angiven särskilt för arten och är lånad från besläktade arter.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %; vissa uppgifter föredrar 80-100 %. Arten kan kortvarigt klara omkring 50 % om den har tillgång till rent vatten, men det är en nödlösning och kan vara dödligt om det varar.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge grodorna en låg vattenskål eller en liten vattendel, och håll vattnet så lågt att den minsta grodan kan sitta med huvud och överkropp ovanför vattnet: arten simmar dåligt. Vattendjupet bör vara 1-2 cm.

LJUS OCH UVB

Grodorna är dagaktiva och lever i regnskogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: LED-ljus 12-14 timmar om dagen är lämpligt. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB, och det används normalt inte.

UTFODRING

R. flavovittata är så liten att den bara kan ta små foderdjur. Ungar och de flesta vuxna äter vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta *D. hydei* och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

R. flavovittata är dagaktiv, snabb och lite skygg. Grodorna blir djärvare om terrariet är tätt bevuxet och har många gömställen, och de vänjer sig vid dig om du tittar på dem genom glaset. Hanarna kallar från öppna platser.

NATURLIG UTBREDNING

Peru.