herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-20 mm från norra Peru. Varje lokal form efterliknar en annan giftig groda i samma område, och arten var den första amfibie där man påvisade äkta monogami: paret tar hand om ungarna tillsammans, och honan matar varje grodyngel med obefruktade ägg.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Mimic Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**7-16 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *R. imitator* kan hållas i ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm. Det måttet passar för 1-3 djur.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Arten tål 18-27 °C men trivs bäst omkring 21-24 °C, och temperaturer över 29 °C är farliga.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Sikta på nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet får torka upp lite mellan sprayningarna; andra uppgifter anger 80-100 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Vattnet får inte vara djupare än att den minsta grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet, för arten simmar dåligt. 1-2 cm är en lämplig nivå.
LJUS OCH UVB	*R. imitator* är dagaktiv och lever i skuggan under skogens tak. Ljuset är först och främst till för växterna. Ge LED-ljus 12-14 timmar om dagen, till exempel kl. 8-20.
UTFODRING	Grundfodret är små leddjur: vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Stora vuxna djur kan också ta den större *D. hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. imitator* är djärv och dagaktiv och syns ofta fritt framme i terrariet. Hanen ropar från fasta platser, och båda könen försvarar parets revir mot artfränder.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/ranitomeya-imitator