herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata är en av de minsta pilgiftsgrodorna: bara 13-17 mm, med kopparröd till orange rygg och blågrå ben med svart nätmönster. Den lever i låglandsskogen i Amazonas i nordöstra Peru och östra Ecuador. I terrariet är den djärv och livlig, men krävande, eftersom äggen är svåra att hitta och ungarna är svåra att få att växa upp.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Red-backed Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates reticulatus* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. reticulata* kan hållas i ett terrarium på 30 × 30 × 45 cm, som också rymmer 2-3 djur. Uppgifterna går upp till 40 × 40 × 40 cm för ett par eller en trio, och ett par har också hållits med god framgång i 40 × 50 × 40 cm.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 22-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Arten trivs bäst omkring 21-24 °C och tål 18-27 °C, medan temperaturer över 29 °C kan vara dödliga.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet torkar upp något mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker.

LJUS OCH UVB

R. reticulata är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen, till exempel LED från kl. 8 till 20, och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.

UTFODRING

Grundfodret är små leddjur. Ungar och de flesta vuxna tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta den större *D. hydei*.

BETEENDE OCH HANTERING

R. reticulata är blixtsnabb och djärv och ses ofta fritt framme, som om den inte har en aning om hur liten den är. Hanarna ropar från fasta platser med ett högt, kort surrande.

NATURLIG UTBREDNING

Peru och Ecuador.