herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 15-25 mm från östra Peru, norra Bolivia och västligaste Brasilien. Arten omfattar de former som tidigare såldes som "lamasi" och "biolat", och de flesta av dem hör till de lättaste pilgiftsgrodorna att få att föröka sig. Grodorna trivs i grupper när det finns tillräckligt med utrymme.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Sira Poison Frog Tidigare namn: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**58-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	1-3 *R. sirensis* kan hållas i ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm, och ett par eller en trio klarar sig också i 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-25 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Arten tål 18-27 °C, men trivs bäst vid 21-24 °C, och temperaturer över 29 °C är farliga.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 80-100 %. Arten tål bara kortvarigt ner till 50 %, och bara om den har tillgång till vatten; låg fuktighet utan vatten kan snabbt bli dödlig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Håll vattnet 1-2 cm djupt, så att den minsta grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet.
LJUS OCH UVB	*R. sirensis* är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.
UTFODRING	Grundfodret är små leddjur: vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Vuxna tar också den större *D. hydei* och nykläckta syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. sirensis* är ofta skygg och gömmer sig gärna, så ett tätt beväxt terrarium med många gömställen ger mest att titta på. Hanen ropar för att locka en hona till en äggläggningsplats.
NATURLIG UTBREDNING	Bolivia, Brasilien och Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilegiftfroeer/ranitomeya-sirensis