herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii är en mycket liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 13-16 mm från Amazonasbäckenet. Den är svart med röda till orange ränder, gula flanker och blå ben, och den är sällsynt i hobbyn. Skötseln bygger på erfarenheterna med släktet, och arten passar för en van hållare med tålamod och en stabil tillgång på pyttesmå foderdjur.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Red Uakari Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates uakarii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**2-7**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-100 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par eller en trio *Ranitomeya uakarii* kan hållas i ett terrarium på 45 × 45 × 45 cm, och 40 × 40 × 40 cm används också för ett par eller en trio. Måtten är lånade från släktet, för artens skötsel är inte beskriven särskilt.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-25 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Siffrorna är lånade från släktet, och uppgifterna varierar från omkring 21-24 °C till 25-28 °C på dagen. Natten får gärna vara upp till omkring 5 grader svalare än dagen.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Spraya dagligen, så att fuktigheten ligger nära 100 % morgon och kväll och på 70-75 % mitt på dagen. Då får terrariet torka upp lite mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Håll vattnet 1-2 cm djupt, så att den lilla grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet; djupet är lånat från släktet.

LJUS OCH UVB

Ranitomeya uakarii är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.

UTFODRING

Basfodret är små leddjur: vinglösa bananflugor, hoppstjärtar, små vita gråsuggor och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

Ranitomeya uakarii är dagaktiv. I ett tätt planterat terrarium med många gömställen ser du vanligtvis mer av grodorna än i ett kargt terrarium, men de små grodorna är ofta blyga och gömmer sig när du kommer fram till glaset.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien, Colombia och Peru.