herpy

PILGIFTSGRODOR

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-19 mm från västra Amazonas. Den lever i träden och föder upp sin avkomma i vatten som samlas i bromelior. Honan matar grodynglen med obefruktade ägg.

Familj: Dendrobatidae Engelska: Brazilian Poison Frog Tidigare namn: *Dendrobates vanzolinii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**1-6**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**19-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett terrarium på 40 × 40 × 40 cm är minimum för ett par *Ranitomeya vanzolinii*, och uppgifterna går upp till 50 × 50 × 50 cm.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen ska ligga på 23-26 °C, och på natten sänks den med 3-4 °C till 19-23 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. Värmefläck behövs inte, och arten har ingen vintervila.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %. Morgon och kväll bör den ligga nära 100 %, och vid middagstid får den sjunka till 70-75 %. Terrariet sprayas dagligen, helst morgon och kväll, med osmosvatten eller regnvatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En vattenskål är inte nödvändig för de vuxna djuren, men är en fördel, och den kan vara låg med 1-2 cm vatten.

LJUS OCH UVB

Ljusbehovet för *Ranitomeya vanzolinii* är måttligt. Grodan behöver tillräckligt med ljus för att se sin föda, och växterna behöver mer. LED-belysning för växter eller ett lysrör, tänt 12-14 timmar om dygnet, är lämpligt.

UTFODRING

Ranitomeya vanzolinii lever på små, levande leddjur: bananflugor, hoppstjärtar, små tropiska gråsuggor och nykläckta syrsor. Små djur kräver små foderdjur.

BETEENDE OCH HANTERING

Ranitomeya vanzolinii är dagaktiv, men blyg. I ett tätt planterat terrarium med många gömställen visar den sig oftare än i ett glest inrett. Grodan har ett drillande läte, som mest hörs på morgonen och kvällen.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien och Peru.