herpy

PILGIFTSGRODOR

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus är en liten, glansigt svart pilgiftsgroda med vita eller gulaktiga fläckar och lysande orange fläckar vid frambenen och knäna. Den lever på skogsbotten i delstaten Pará i brasilianska Amazonas och har fått sitt namn efter paranöten, vars tomma skal hanen använder som vattenbassäng åt grodynglen. Det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates castaneoticus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-23 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**5-7 mån.**
Ägg per läggning	**4-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och andra grodyngel**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Adelphobates castaneoticus*. Arten lever i lövstreet på skogsbotten i ett varmt och fuktigt låglandsklimat.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska ligga på 24-27 °C, och på natten sjunker den 3-4 °C, till 20-24 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. Det stämmer med låglandsklimatet i Pará.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på omkring 70-80 % mitt på dagen och nära 100 % morgon och kväll, och lövlagret och substratet ska vara fuktiga hela tiden.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Någon vattenskål behövs inte, om man inte vill ha avkomma. Grodorna får sin fukt från sprayningen och det fuktiga lövet.
LJUS OCH UVB	Ge 10-12 timmars ljus per dag med lysrör eller LED för växterna. I naturen lever arten i skuggan under trädkronorna, så ljuset ska ge växterna tillräckligt för att växa utan att värma upp terrariet.
UTFODRING	*A. castaneoticus* lever i naturen av myror, termiter och andra små leddjur. I fångenskap utfodras den med hoppstjärtar, små bananflugor och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	*A. castaneoticus* är dagaktiv och lever mest på skogsbotten. Temperament och revirbeteende är inte dokumenterade, men *A. galactonotus* kan bli aggressiv mot artfränder när den blir könsmogen.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/adelphobates-castaneoticus