herpy

PILGIFTSGRODOR

## Rio Madeira Poison Frog

# *Adelphobates quinquevittatus*

*Adelphobates quinquevittatus* är en mycket liten, blankt lackerad svart pilgiftsgroda på 14-16 mm med vita ränder och grå, grönaktiga eller orange ben. Den lever i regnskogens lövstreck i Rio Madeiras avrinningsområde i södra Amazonas och hålls bara sällan. Det finns mycket lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae  Tidigare namn: *Dendrobates quinquevittatus*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **14-16 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **8-15 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **4-8** |
| Kläckning | **10-14 dagar** |
| Larvtid | **60-90 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och andra grodyngel** |
| Yngelvård | **Bär grodynglen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **24-27 °C** |
| Temperatur, natt | **20-24 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Ingen vattenskål** |
| UVB | **Valfritt** |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**
Det finns mycket lite kunskap om skötseln av *Adelphobates quinquevittatus*. Arten lever i lövstreck i ett varmt och fuktigt låglandsklimat.

**TEMPERATUR**
Dagstemperaturen ska ligga på 24-27 °C, och på natten sjunker den 3-4 °C, till 20-24 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. Det passar med låglandsklimatet i Rondônia.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**
Luftfuktigheten ska vara omkring 70-80 % mitt på dagen och nära 100 % på morgonen och kvällen, och lövlagret och substratet ska vara fuktiga hela tiden.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**
En vattenskål är inte nödvändig om man inte vill ha yngel. Grodorna får fukten från sprayning och det fuktiga lövet.

**LJUS OCH UVB**
Ge 10-12 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED till växterna. I naturen lever arten i skuggan under skogens kronor, så ljuset ska ge växterna nog för att växa utan att värma upp terrariet.

**UTFODRING**
*A. quinquevittatus* lever i naturen mest av myror och termiter. I fångenskap matas den med små bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar, mikrosyrsor, små vaxmalslarver, siktat ängsplankton och små gråsuggor.

**BETEENDE OCH HANTERING**
*A. quinquevittatus* är dagaktiv och lever mest i lövstreck. Temperament och revirbeteende är inte dokumenterade.

**NATURLIG UTBREDNING**
Brasilien.