herpy

PILGIFTSGRODOR

Brilliant-thighed Poison Frog

Allobates femoralis

Allobates femoralis är en liten, mörk groda på 3-4 cm från Amazonas och Guyanaskölden med en orangegul fläck bakom armen och en halvmåneformad orange fläck på låret. Den är dagaktiv och markbunden, hanarna försvarar revir med ett högt läte, och uppvaktningen är en av de längsta bland pilgiftsgrodorna. Arten tillhör familjen Aromobatidae och räknas som ogiftig.

Familj: Aromobatidae Tidigare namn: *Epipedobates femoralis; Phyllobates femoralis; Dendrobates femoralis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**8-20**
Kläckning	**15-20 dagar**
Larvtid	**40-50 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *Allobates femoralis* ska ha ett glasterrarium på minst 60 × 40 × 40 cm. Arten lever nära marken, så golvytan räknas mest, men hanarna klättrar gärna lite uppåt för att locka.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 25-28 °C och på natten 21-24 °C, alltså 3-4 grader lägre. Det dagliga svinget motsvarar förhållandena i Franska Guyana och främjar aveln.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara hög: 70-80 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge en låg glasskål på omkring 10 cm i diameter med 1-2 cm vatten, som grodorna lätt tar sig upp ur. Den används också av hanen när han ska lämna av grodynglen.

LJUS OCH UVB

Ljuset är först och främst till växterna. Ge 12 timmars ljus per dag, till exempel från kl. 7 till 19. Lysrör eller LED på omkring 6.500 K ger naturliga färger och bra växtlighet.

UTFODRING

Allobates femoralis lever av små insekter. I terrariet består grundfodret av vinglösa bananflugor, kompletterade med hoppstjärtar, helt små syrsor, små vaxmalslarver och ängsplankton.

BETEENDE OCH HANTERING

Allobates femoralis är dagaktiv, och hanarna är revirhävdande.

NATURLIG UTBREDNING

Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Peru och Surinam.