herpy

PILGIFTSGRODOR

Ameerega pepperi

Ameerega pepperi är en liten, svart pilgiftsgroda med gula streck och röda, orange eller gula teckningar från centrala Peru. Den lever vid bäckar i skog på 380-1.000 m höjd och är sårbar på grund av avverkning. Det finns bara lite kunskap om skötseln, som därför bygger på livsmiljön och nära släktingar.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**22-44**
Larvtid	**35-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**75-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega pepperi*. Arten lever vid bäckar i fuktig skog på 380-1.000 m höjd.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 21-25 °C och på natten 18-21 °C. Temperaturen får inte komma över 27 °C, eftersom pilgiftsgrodor tål värme dåligt. På sommaren kan en fläkt eller ett svalt rum behövas. Det finns ingen vintervila.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 75-100 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten och en sten eller gren som landgång räcker. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat vatten och byt det var 2:a-3:e dag.
LJUS OCH UVB	Ge växtvänligt ljus i 10-12 timmar dagligen, med skugga och gömställen. UVB är inte dokumenterat som nödvändigt för arten, men en svag UVB-källa (Ferguson-zon 1) kan användas. Se till att ljuset inte värmer upp terrariet.
UTFODRING	*Ameerega pepperi* är liten och tar små foderdjur: bananflugor (mest *Drosophila melanogaster*, mindre *Drosophila hydei*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Utfodra varje eller varannan dag med så mycket som djuren äter på en timme.
BETEENDE OCH HANTERING	Hanarna är revirhävdande och kallar från stenar. Arten hålls bäst som par i ett terrarium med många gömställen. Grodor bör inte hanteras, eftersom huden är ömtålig och hanteringen stressar djuren.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.