herpy

PILGIFTSGRODOR

Peru Poison Frog

Ameerega petersi

Ameerega petersi är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 24-30 mm från regnskogen vid Andernas fot i östra Peru och västra Brasilien. Ryggen är brun med ett ljust, snett sidostreck. Arten hålls sällan, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Epipedobates petersi; Dendrobates petersi*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**2-3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Temperatur, natt	**21-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**4-16**
Kläckning	**10-22 dagar**
Larvtid	**70-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega petersi*, men arten hålls i små antal, och grundsiffrorna för terrariet är kända. Den sköts som andra små *Ameerega*-arter från regnskogens lövlager.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen är 25-28 °C, och på natten sänks den 3-4 grader till 21-25 °C. Variationen över året är bara 1-2 grader.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %: nära 100 % morgon och kväll, gärna med dimma, och omkring 70-80 % mitt på dagen. Spraya med osmos- eller regnvatten morgon och kväll, eller använd ett dimm- eller regnsystem på timer.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Skålen ska vara så låg att en unge kan ta sig upp ur den, och ha stenar eller mossa i kanten. Byt vattnet ofta, och rengör skålen med varmt vatten utan tvål.

LJUS OCH UVB

Ge ett LED-ljus med ett spektrum anpassat för växter i 10-12 timmar om dagen. UVB är inte nödvändigt för pilgiftsgrodor; ett svagt UVB-ljus (Ferguson-zon 1) är valfritt.

UTFODRING

Kosten består av små levande leddjur från lövlagret. I terrariet används vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster* och *D. hydei*), hoppstjärtar, små gråsuggor, mikrosyrsor, siktat ängsplankton och de minsta vaxmalslarverna.

BETEENDE OCH HANTERING

Hanarna i släktet kallar och försvarar små revir. Det är inte beskrivet hur *Ameerega petersi* beter sig i grupper, så ett par är den säkraste hållningsformen.

NATURLIG UTBREDNING

Peru och Brasilien.