herpy

PILGIFTSGRODOR

Spot-legged Poison Frog

Ameerega picta

Ameerega picta är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda med mörkbrun rygg, svarta sidor med ljusa streck och gula till röda fläckar på låren. Den lever på skogsbotten från Amazonas låglandet upp till Andernas fot i Bolivia, Peru, Colombia och Brasilien och har ett isolerat bestånd i Venezuela. Arten hålls bara sällan, så skötseln bygger på klimatet i utbredningsområdet och på nära släktingar.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Epipedobates pictus; Dendrobates pictus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**22-28 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**15-40**
Kläckning	**15-22 dagar**
Larvtid	**40-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega picta*. Arten hålls bara sällan, och den stora höjdutbredningen gör det svårt att säga vilket klimat det enskilda beståndet är anpassat till.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-25 °C på dagen, och låt temperaturen sjunka 3-4 °C på natten, till 18-22 °C. Variationen över året ska vara liten, 1-2 °C. Grodor tål värme dåligt: temperaturer över omkring 28 °C är farliga.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-80 % mitt på dagen och nära 100 % morgon och kväll. Ett regnsystem eller en dimmaskin med timer är lättast; annars sprayas två till tre gånger om dagen med osmosvatten eller regnvatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge en låg vattenskål med 1-2 cm vatten, så att grodorna lätt tar sig upp ur den, och med stenar eller mossa i kanten. Skålen används av de vuxna när grodynglen ska sättas av.

LJUS OCH UVB

Ljuset är främst till för växterna: 10-12 timmar om dagen med LED-ljus med ett spektrum anpassat för växter. Det är inte dokumenterat att *Ameerega picta* behöver UVB.

UTFODRING

Grodan lever i naturen av små leddjur. I terrariet består kosten av vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster* och *D. hydei*), hoppstjärtar, små gråsuggor, mikrosyrsor, små vaxmalslarver och siktat ängsplankton.

BETEENDE OCH HANTERING

Ameerega picta är dagaktiv och lever mest på marken. Hanarna i släktet försvarar små revir, så ett par är den säkraste hållningsformen. Håll inte två hanar tillsammans i ett litet terrarium.

NATURLIG UTBREDNING

Bolivia, Brasilien, Peru, Colombia och Venezuela.