herpy

PILGIFTSGRODOR

Silverstone's Poison Frog

Ameerega silverstonei

Ameerega silverstonei är en orangeröd pilgiftsgroda på omkring 4 cm som bara är känd från Cordillera Azul på Andernas östsluttningar i Peru. Den lever i sval bergsskog på omkring 1.300-1.500 m höjd, är hotad av förlust av livsmiljö och hålls sällan. Skötseln kräver ett svalt terrarium.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Epipedobates silverstonei; Dendrobates silverstonei; Phobobates silverstonei*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**15-16 mån.**
Ägg per läggning	**30-45**
Kläckning	**30 dagar**
Larvtid	**55-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-20 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Ameerega silverstonei*. Den bygger på klimatet i bergsskogen på omkring 1.300-1.500 m: svalt, fuktigt och stabilt året runt.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 20-24 °C, helst i den svala änden, och på natten 17-20 °C. Temperaturen får inte komma över 25 °C. Sval luft är inget problem så länge svängningarna är små.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %: omkring 70 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll. Spraya 1-3 gånger dagligen med regnvatten eller osmosvatten, eller använd ett regnsystem och eventuellt en dimgenerator.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Använd regnvatten, osmosvatten eller avklorerat vatten, och byt det ofta. Vattnet ska vara svalt, precis som luften. Lägg stenar eller grenar i skålen så att ungarna kan ta sig upp.

LJUS OCH UVB

Arten lever på skuggig skogsbotten, så ljuset ska vara måttligt, och det ska finnas skugga. Lysrör eller LED med växtvänligt spektrum i 10-12 timmar dagligen räcker.

UTFODRING

Ameerega silverstonei tar små till stora foderdjur: stora bananflugor (*Drosophila hydei*), nykläckta syrsor, de minsta vaxmalslarverna och håvade småinsekter från ängen. Hoppstjärtar och små gråsuggor kompletterar.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är skygg och drar sig ofta in under löv eller korkbark. Den kan hållas i grupper, men hanarna är revirhävdande, så håll ett par eller en grupp med fler honor än hanar.

NATURLIG UTBREDNING

Peru.