herpy

PILGIFTSGRODOR

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata är en stor, dagaktiv pilgiftsgroda på 4-6 cm från Amazonas skogsbotten. Den är svart med två ljusgröna ränder längs sidorna, och hanen bär vid ett enda tillfälle ofta 15-30 grodyngel på ryggen till vatten. Grodan kräver ett rymligare terrarium än de små pilgiftsgrodorna.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-6 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Ägg per läggning	**15-40**
Kläckning	**15-22 dagar**
Larvtid	**40-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**70 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett terrarium på minst 70 × 50 × 50 cm (längd, bredd, höjd) passar för två vuxna *Ameerega trivittata*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen hålls på 23-25 °C, och på natten sänks den med 3-4 °C till omkring 19-22 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 80-90 % större delen av dagen, nära 100 % morgon och kväll, och den får sjunka till omkring 70 % mitt på dagen. Längre tid under 70 % är farligt, särskilt om grodan inte har tillgång till vatten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Skålen ska vara så låg att en unge kan ta sig upp ur den, och ha stenar eller mossa i kanten. Skål och vatten byts ofta, och skålen rengörs med varmt vatten utan tvål.
LJUS OCH UVB	UVB är inte dokumenterat som nödvändigt för pilgiftsgrodor i allmänhet, och för just den här arten finns inga uppgifter. En svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) är valfri.
UTFODRING	Kosten består av små levande leddjur.
BETEENDE OCH HANTERING	Hanarna kallar högljutt och försvarar små revir, medan honorna är lugna. Det är inte dokumenterat hur arten beter sig i grupper i fångenskap, så par är det säkraste sättet att hålla dem.
NATURLIG UTBREDNING	Bolivia, Brasilien, Colombia, Guyana, Peru, Surinam och Venezuela.