herpy

PILGIFTSGRODOR

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae beskrevs som den minsta pilgiftsgrodan: vuxna djur mäter bara omkring 13 mm. Den lever i lövstrecken i låglandsskog i Bocas del Toro i nordvästra Panama, både på öarna och på fastlandet. Arten är hotad, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Ranitomeya claudiae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Expert**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Andinobates claudiae*. Skötseln bygger på livsmiljön: varm, fuktig låglandsskog med regn större delen av året och ett tjockt lövskikt.

TEMPERATUR
Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C och natten 19-22 °C. Temperaturen får inte ligga över 27 °C någon längre tid, och över 29 °C är farligt, så terrariet får inte stå i sol eller nära en värmekälla.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya terrariet 1-2 gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten så att lövet hålls fuktigt, eller använd ett regnsystem på timer. Botten ska vara fuktig men aldrig stå under vatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
De vuxna grodorna behöver ingen vattenskål; de får vatten genom huden från sprayningen och det fuktiga lövet.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och lever i skugga på skogsbotten. LED-belysning i omkring 12 timmar om dagen räcker för växterna. UVB behövs inte; ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 kan användas om det finns gott om skugga.

UTFODRING
Andinobates claudiae är så liten att foderdjuren måste vara de minsta som finns: hoppstjärtar, små vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor. Även vanliga bananflugor kan vara för stora.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är dagaktiv och håller sig i lövstrecken och vid gömställena. Hanarna kallar från fasta platser och försvarar sitt område, så hållningsformen är ett par. Flera hanar i samma terrarium ger stress och slagsmål.

NATURLIG UTBREDNING
Panama.