herpy

PILGIFTSGRODOR

Yellow-bellied Poison Frog

Andinobates fulguritus

Andinobates fulguritus är en av de minsta pilgiftsgrodorna: bara 14-17 mm, svart med gula eller grönaktigt gula strimmor och en gul, svartmarmorerad buk. Den lever i lövstreckan i fuktig låglandsskog i nordvästra Colombia och centrala och östra Panama. Arten hålls knappast, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Ranitomeya fulgurita; Dendrobates fulguritus; Minyobates fulguritus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates fulguritus*. Skötseln bygger på livsmiljön: varm, fuktig låglandsskog med regn större delen av året och ett tjockt lövskikt.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C och natten 19-22 °C. Temperaturen får inte ligga över 27 °C någon längre tid, och över 29 °C är farligt, så terrariet får inte stå i sol eller nära en värmekälla.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya terrariet 1-2 gånger om dagen med regnvatten eller osmosvatten så att lövet hålls fuktigt, eller använd ett regnsystem på timer. Botten ska vara fuktig men aldrig stå under vatten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	De vuxna grodorna behöver ingen vattenskål; de får vatten genom huden från sprayningen och det fuktiga lövet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och lever i skugga på skogsbotten. LED-belysning i omkring 12 timmar om dagen räcker för växterna. UVB behövs inte; ett svagt UVB-ljus i Ferguson-zon 1 kan användas om det finns gott om skugga.
UTFODRING	I naturen lever pilgiftsgrodor av små myror och kvalster. *Andinobates fulguritus* är så liten att foderdjuren måste vara de minsta som finns: hoppstjärtar, små vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och håller sig i lövstreckan och vid gömställena. Hanarna kallar från fasta platser och försvarar sitt område, så hållningsformen är ett par. Flera hanar i samma terrarium ger stress och slagsmål.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia och Panama.