herpy

PILGIFTSGRODOR

## Andean Poison Frog

# *Andinobates opisthomelas*

*Andinobates opisthomelas* är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 15-20 mm från Colombias Anderna, där den lever i lövstrecken i fuktig bergsskog i Antioquia och Caldas. Arten är sårbar i naturen, och det finns nästan ingen kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae  Tidigare namn: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **15-20 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **5-10 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Marklevande** |
| Biotop | **Bergsskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Erfaren** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **På marken** |
| Ägg per läggning | **1-2** |
| Kläckning | **16-24 dagar** |
| Larvtid | **108-112 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Bär grodynglen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 50 × 60 cm**<br>L × B × H för 5 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **22-25 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **80-100 %** |
| Vatten | **Ingen vattenskål** |
| UVB | **Valfritt**<br>Fergusonzon 1 |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Sårbar (VU)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Andinobates opisthomelas*, och arten hålls knappast. Skötseln bygger på livsmiljön, den svala och fuktiga bergsskogen med lövskikt och bromelior, och på nära släktingar. |
| **TEMPERATUR** | Dagstemperaturen ska vara 22-25 °C, och på natten får den gärna sjunka till 18-21 °C som i bergsskogen. Håll temperaturen under 27 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Luftfuktigheten ska vara 80-100 % och aldrig under 70 %. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | Det behövs ingen vattenskål; grodorna dricker droppar från växter och sprayvatten. Till grodynglen används bromelior med vatten i bladvecken eller små plastbägare med 2-3 cm vatten. |
| **LJUS OCH UVB** | Ljuset är främst till för växterna: växtljus i 10-12 timmar om dagen ger dygnsrytm och tillväxt. UVB behövs knappast, men en svag UVB-ljuskälla (zon 1) över en del av terrariet skadar inte när det finns skugga under växterna. |
| **UTFODRING** | Fodret är små leddjur: hoppstjärtar, små bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor. Nyförvandlade ungar tar bara hoppstjärtar. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | *Andinobates opisthomelas* är dagaktiv och lever på marken, så den håller sig lågt i terrariet, i lövstrecken och vid bromeliorna. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Colombia. |