herpy

PILGIFTSGRODOR

Santander Poison Frog

Andinobates virolinensis

Andinobates virolinensis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på upp till 19 mm med scharlakansrött huvud och framkropp och brun bakkropp. Den finns bara i molnskogen på den östra Andernas bergskedja i Colombia. Arten är sårbar i naturen och hålls knappast, så skötseln bygger på livsmiljöns svala, fuktiga bergsklimat.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Ranitomeya virolinensis; Dendrobates virolinensis; Minyobates virolinensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-2**
Kläckning	**16-24 dagar**
Larvtid	**108-152 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**19-23 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**85-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Andinobates virolinensis*, och arten hålls knappast i fångenskap. Skötseln bygger på livsmiljön: sval, fuktig molnskog med tjockt lövskikt och bromelior.

TEMPERATUR
Temperaturen har inte mätts i artens livsmiljö. 19-23 °C på dagen och 15-19 °C på natten passar för molnskog på 1.300-2.400 m höjd.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara 85-100 % med ett fuktigt lövskikt hela året.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Arten ska inte ha någon vattendel. Vattnet finns i bromeliornas bladtrattar, där grodynglen växer upp, och det ska bytas regelbundet så att det inte blir grumligt. Använd osmosvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten.

LJUS OCH UVB
A. virolinensis lever på skogsbotten i skugga, så ljuset är främst till för växterna. Ge 10-12 timmars ljus om dagen med LED eller lysrör och mörker på natten. Det har inte dokumenterats att arten behöver UVB.

UTFODRING
Fodret är små leddjur: hoppstjärtar och bananflugor (*Drosophila*) i minsta storlek och små gråsuggor. Mata 3-4 gånger i veckan, och låt det alltid finnas levande foderdjur i terrariet.

BETEENDE OCH HANTERING
Beteendet i fångenskap har inte dokumenterats. I naturen delar flera vuxna samma bromelia, så arten tål troligen sällskap och kan hållas i par eller en liten grupp.

NATURLIG UTBREDNING
Colombia.