herpy

PILGIFTSGRODOR

Yellow-banded Poison Frog

Dendrobates leucomelas

Dendrobates leucomelas är en av de största och djärvaste pilgiftsgrodorna: 3-5 cm, klargul med breda svarta band, dagaktiv och alltid ute i terrariet. Den är härdig, lockar med höga, fågellika drillar och är en klassisk första pilgiftsgroda.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-5 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**3 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**10-24 mån.**
Ägg per läggning	**2-12**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**70-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-22 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *Dendrobates leucomelas* ska ha ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. En trio eller en större grupp behöver mer plats, till exempel 60 × 45 × 45 cm, och fler gömslen än djur.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen hålls på 22-26 °C med ett litet fall på natten till 19-22 °C. Även om arten upplever 26-30 °C i naturen tål den värme dåligt i terrariet, och överhettning är ett av de vanligaste misstagen.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 80-95 %. Spraya en till två gånger om dagen med osmosvatten eller avkloramt kranvatten, så att löv och växter blir blöta, och låt ytan torka lite mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål med 1-2 cm vatten räcker. Grodorna är dåliga simmare och kan drunkna i djupt vatten, så skålen ska ha en låg kant eller en sten att klättra upp på. Använd osmosvatten eller avkloramt kranvatten utan tillsatser.

LJUS OCH UVB

Grodorna och växterna behöver 12 timmars ljus per dag. Använd en LED-lampa med fullt spektrum som inte avger mycket värme och placera den ovanför locket. Det finns inget dokumenterat behov av UVB hos arten, så UVB är valfritt.

UTFODRING

I naturen äter *D. leucomelas* myror, termiter, små skalbaggar och andra små insekter och spindlar.

BETEENDE OCH HANTERING

Dendrobates leucomelas är dagaktiv och djärv, särskilt de venezuelanska formerna, som nästan alltid är ute. Formerna från Guyana är mer skygga.

NATURLIG UTBREDNING

Venezuela, Guyana, Brasilien och Colombia.