herpy

PILGIFTSGRODOR

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi är en liten, röd och randig pilgiftsgroda på 19-27 mm från sydvästra Ecuador och nordvästra Peru. Det är den groda som i decennier har sålts som ”tricolor”, och den är nog den mest hållna och uppfödda pilgiftsgrodan överhuvudtaget: härdig, djärv, gillar att ropa och är flitig på att föröka sig.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19-27 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-14 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**5-10 mån.**
Ägg per läggning	**10-40**
Kläckning	**9-14 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**43-89 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm passar för en hane och två honor av *Epipedobates anthonyi*. En grupp på 5-10 djur behöver minst 60 × 60 × 40 cm, och fler djur kräver mer golvyta.
TEMPERATUR	Håll 22-26 °C på dagen med både svalare och varmare zoner, och låt temperaturen sjunka till rumstemperatur på natten, omkring 18-21 °C. Temperaturen får inte komma över 27 °C någon längre tid, och över 29 °C är farligt.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 80-100 %. Arten tål ner till 50 % under korta perioder om den har tillgång till vatten, men låg luftfuktighet utan vatten kan snabbt bli dödlig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Gör en eller flera små vattenhål med omkring 2 cm vatten, till exempel underfat, dricksskålar eller halva paranötsskal, som grodorna lätt tar sig upp ur.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till växterna. Lysrör eller LED-listor i omkring 12 timmar per dag räcker, och dagslängden får gärna variera något över året. UVB är inte nödvändigt för grodornas välbefinnande, men kan ges som ett svagt tillskott.
UTFODRING	*Epipedobates anthonyi* är liten men glupsk och tar förhållandevis stora byten.
BETEENDE OCH HANTERING	*Epipedobates anthonyi* är dagaktiv, djärv och ofta framme, och hanarna ropar med en drill, mest på morgonen och efter sprayning.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador och Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/epipedobates-anthonyi