herpy

PILGIFTSGRODOR

Phantasmal poison frog

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor är en liten, mörkbrun pilgiftsgroda på 19-23 mm med gula till gulgröna ränder och fläckar. Den lever bara på Andernas västra sluttningar i centrala Ecuador och är hotad. Nästan alla ”tricolor” i handeln är i verkligheten den nära släktingen *Epipedobates anthonyi*; äkta *E. tricolor* är sällsynt i terrarierna.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates tricolor; Phyllobates tricolor*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19-23 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-14 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**5-10 mån.**
Ägg per läggning	**10-20**
Kläckning	**9-14 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**42-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	En hane och två honor av *Epipedobates tricolor* behöver ett terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm. En grupp på 5-10 djur behöver minst 60 × 60 × 40 cm, och fler djur kräver mer golvyta.
TEMPERATUR	Håll 22-26 °C på dagen med både svalare och varmare zoner, och låt temperaturen sjunka till 18-20 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 80-100 %. Arten tål ner till 50 % under korta perioder om den har tillgång till vatten, men låg luftfuktighet utan vatten kan snabbt bli dödlig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Gör en eller flera små vattenhål med omkring 2 cm vatten, till exempel underfat, dricksskålar eller halva paranötsskal, som grodorna lätt tar sig upp ur. Hanen kan använda dem för att avsätta grodyngel.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till för växterna. Lysrör eller LED-list i omkring 12 timmar om dagen räcker, och dagslängden kan gärna variera något över året.
UTFODRING	*Epipedobates tricolor* är liten men glupsk och tar förhållandevis stora byten.
BETEENDE OCH HANTERING	Hanarna av *Epipedobates tricolor* ropar med en stilla, drillande röst, mest på morgonen och särskilt efter sprayning, oftast från en förhöjd sittplats.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador.