herpy

PILGIFTSGRODOR

Sky-blue Poison Frog

Hyloxalus azureiventris

Hyloxalus azureiventris är en dagaktiv pilgiftsgroda på 25-28 mm, svart med gula ränder, blågrön marmorering och lysande blå teckningar på benen och undersidan. Arten finns bara i ett litet område i norra Peru och är klassificerad som hotad. Den är sällsynt i terrariehobbyn och kräver en erfaren hållare, men kan fortplantas i fångenskap.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Cryptophyllobates azureiventris; Phyllobates azureiventris*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-28 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och klippterräng**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**10-17**
Kläckning	**12-14 dagar**
Larvtid	**42 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm (längd, bredd, höjd) passar för ett par *Hyloxalus azureiventris*. Arten lever på marken, så bottenytan betyder mer än höjden.
TEMPERATUR	Håll *Hyloxalus azureiventris* på 24-26 °C på dagen, och låt temperaturen sjunka 3-4 °C på natten, till omkring 20-23 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten får inte länge ligga under 70-80 %. Morgon och kväll ska den upp på nästan 100 % med dimma eller regn, medan den gärna får sjunka till omkring 70 % mitt på dagen.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten behöver en liten, grund vattenskål för dricksvatten och som möjlig förökningsplats. Använd en skål med 1-2 cm vatten och platt kant, så att grodorna kan ta sig in och ut, och så att ingen drunknar.
LJUS OCH UVB	Något behov av UVB är inte dokumenterat hos arten. En svag UVB-lampa (Ferguson-zon 1) kan användas som valfritt tillskott, om djuren har möjlighet att söka sig bort från den.
UTFODRING	*Hyloxalus azureiventris* behöver små, levande bytesdjur.
BETEENDE OCH HANTERING	*Hyloxalus azureiventris* är dagaktiv och lever dolt bland stenar, rötter och löv. Vuxna djur är mycket aggressiva mot artfränder av samma kön: både hanar och honor hoppar på varandra och klamrar sig fast.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/hyloxalus-azureiventris