herpy

PILGIFTSGRODOR

Trinidad Poison Frog

Mannophryne trinitatis

Mannophryne trinitatis är en liten, brun och dagaktiv groda på 25-28 mm, som bara finns på Trinidad, där den lever vid klara, steniga bäckar i fuktig skog. Hanen kan bli kolsvart när han kallar, och honan har en klargul strupe. Arten hålls knappast, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Aromobatidae Tidigare namn: *Phyllobates trinitatis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-28 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Inget känt**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattendel** djup 3-5 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**6-13**
Kläckning	**21 dagar**
Larvtid	**40-50 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Mannophryne trinitatis*.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 23-27 °C och natten 20-22 °C. Grodor från skogsbäckar tål värme dåligt, så håll temperaturen under 28 °C. Arten har ingen vintervila, men i naturen finns en torrare tid från januari till maj.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %. Spraya dagligen så att blad och stenar är våta. Ett dimsystem gör det lättare att hålla fukten stabil. Se till att det finns ventilation så att luften inte blir stillastående.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Arten ska ha en fast vattendel med grunt, rent och gärna lätt strömmande vatten, 3-5 cm djupt, med stenar och löv. En liten pump kan ge lite ström, och grodorna ska lätt kunna ta sig upp på land.
LJUS OCH UVB	UVB behövs knappast, men en låg dos (Ferguson-zon 1) är valfri. Växtljus i 10-12 timmar håller mossa och ormbunkar vid liv. Ge skugga med växter och bark, så att grodorna kan söka sig bort från det skarpa ljuset.
UTFODRING	Arten ska få små leddjur: små och stora bananflugor (*Drosophila melanogaster* och *Drosophila hydei*), hoppstjärtar och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Mannophryne trinitatis* är dagaktiv och revirhävdande. Honorna försvarar sina platser oftare än hanarna, med hot, brottning och jakt, och de visar upp den gula strupen som hot.
NATURLIG UTBREDNING	Trinidad och Tobago.