herpy

PILGIFTSGRODOR

Polkadot Poison Frog

Oophaga arborea

Oophaga arborea är en liten pilgiftgroda på 20-22 mm som lever högt uppe i träden i den fuktiga bergsskogen i västra Panama. Den är svart eller brun med runda gula fläckar, förökar sig i bromelior 10-16 m över marken, och grodynglen lever bara av ägg från honan. Arten är akut hotad.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates arboreus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-22 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Expert**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**4-8**
Kläckning	**14 dagar**
Larvtid	**40-50 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 80 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Oophaga arborea*, och arten är nästan okänd i fångenskap.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska ligga på 20-24 °C, och på natten ska den sjunka minst 4-5 °C, till omkring 15-19 °C. Det motsvarar molnskogens klimat med en årsmedeltemperatur omkring 19 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % på dagen och stiga till 100 % på natten. Använd rikligt med dimma och regn, och låt terrariet torka snabbt efteråt med hjälp av en fläkt; stillastående, våt luft är farlig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål är inte nödvändig. Grodorna får fukt från dimma, regn och de vattenfyllda bromeliorna, som också används till grodynglen.
LJUS OCH UVB	Arten lever högt uppe i kronorna, där ljuset är starkare än på skogsbotten, men dimman dämpar det.
UTFODRING	Vuxna djur får små, flygoförmögna bananflugor, hoppstjärtar, nykläckta mikrosyrsor och fältplankton; samma foderdjur används för släktets övriga arter. I naturen består födan av små leddjur, och det är därifrån giftet kommer.
BETEENDE OCH HANTERING	*Oophaga arborea* är en dagaktiv trädgroda som sällan ses på marken.
NATURLIG UTBREDNING	Panama.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/oophaga-arborea