herpy

PILGIFTSGRODOR

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera är en liten, dagaktiv pilgiftgroda på 19-22 mm från Stillahavssidan av Costa Rica och yttersta västra Panama. Huden är tydligt kornig, ryggen röd, orange eller olivgrön, och ben och buk är blågröna till turkosa. Arten lever längs skuggiga skogsbäckar, och honan matar sina grodyngel med obefruktade ägg.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates granuliferus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19-22 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12-18 mån.**
Ägg per läggning	**2-5**
Kläckning	**19-20 dagar**
Larvtid	**87-212 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Oophaga granulifera*, och arten är sällsynt i hobbyn.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska ligga på 21-25 °C, och grodorna är mest aktiva vid 20-22 °C. På natten ska temperaturen sjunka 4-5 °C, till omkring 17-21 °C. Årstidsvariationen är minimal, omkring 1-2 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 80-90 %, och 100 % tidigt på morgonen och sent på dagen, när terrariet sprutas. Även under torrtiden sjunker fuktigheten längs bäckarna sällan under 80 %, och det är också gränsen för terrariet.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ett lågt vattenfat på 1-2 cm djup, till exempel en låg skål nedgrävd i botten eller en vattendel mellan stenarna, ger dricksvatten och luftfuktighet.
LJUS OCH UVB	Arten lever i skuggig skogsbotten, så ljuset ska först och främst täcka växternas behov. Använd LED eller lysrör med hög verkningsgrad, gärna omkring 6.500 K, 10-12 timmar per dygn; det passar dagslängden i Costa Rica nära 9° nord.
UTFODRING	Vuxna djur får små, flygoförmögna bananflugor, hoppstjärtar, nykläckta mikrosyrsor, de minsta vaxmottslarverna och fältplankton.
BETEENDE OCH HANTERING	*Oophaga granulifera* är skygg och lever mycket gömd, särskilt under torrtiden, då den nästan helt stänger av. Hanarna försvarar en kallplats och kallar mest under regntiden; strider är sällsynta och följer efter ljudsignaler.
NATURLIG UTBREDNING	Costa Rica och Panama.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/oophaga-granulifera