herpy

PILGIFTSGRODOR

Harlequin Poison Frog

Oophaga histrionica

Oophaga histrionica är en dagaktiv pilgiftsgroda på 3-4 cm från regnskogen i västra Colombia, brun till svart med stora orange fläckar. Grodynglen lever uteslutande av obefruktade ägg som honan lägger åt dem, och det gör arten till en av de svåraste pilgiftsgrodorna att föda upp. Den är akut hotad, och artens avgränsning ändrades 2018.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates histrionicus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**9 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Expert**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**12 mån.**
Ägg per läggning	**4-20**
Kläckning	**10 dagar**
Larvtid	**90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par behöver ett regnskogsterrarium på minst 50 × 50 × 50 cm, och större är bättre. *Oophaga*-arter kan vara territoriella, så håll bara ett par om inte terrariet är mycket stort.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska ligga på 24-26 °C, och på natten sänks den 5-6 grader, till 18-21 °C. Temperaturen behöver bara variera 1-2 grader över året, och det finns ingen vintervila.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-80 % mitt på dagen och upp mot 100 % morgon och kväll. Det klaras lättast med ett regnsystem och ett dimsystem på timer.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med omkring 1 cm vatten och en ramp av sten eller mossa räcker för de vuxna. Använd osmosvatten, regnvatten eller avklorerat kranvatten, och byt vattnet ofta.
LJUS OCH UVB	Ljuset är framför allt till för bromelior och andra växter. Ge omkring 12 timmars ljus om dagen med LED eller lysrör som inte värmer mycket.
UTFODRING	*Oophaga histrionica* äter små leddjur, i naturen framför allt myror, termiter, kvalster och små skalbaggar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Oophaga histrionica* är dagaktiv. Hanen ropar från en låg sittplats, och hanarna försvarar sina revir. Håll därför bara ett par i terrariet. Hantera inte grodorna. Huden är känslig, och djuren stressas lätt.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/oophaga-histrionica