herpy

PILGIFTSGRODOR

Lehmann's Poison Frog

Oophaga lehmanni

Oophaga lehmanni är en sällsynt, dagaktiv pilgiftsgroda från ett litet område i västra Colombia, svart eller mörkbrun med breda band av rött, orange eller gult. Den är akut hotad i naturen, och bara uppfödda djur hör hemma i ett terrarium. Arten kräver en erfaren hållare: den tål inte värme, och grodynglen lever uteslutande av ofruktade ägg från honan.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates lehmanni*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**4-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per läggning	**3-10**
Kläckning	**14-28 dagar**
Larvtid	**60-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**17-19 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *O. lehmanni* behöver ett terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre, särskilt för avel. Arten är förhållandevis stor och territoriell, så extra plats och många gömslen förebygger gräl.
TEMPERATUR	*O. lehmanni* kommer från svalt bergsregnskog och är känsligare för värme än de flesta pilgiftsgrodor. Den trivs bäst vid 22-24 °C under dagtid, och 24-25 °C bör inte överskridas, inte ens för en kort stund.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %: hög på morgonen och kvällen, gärna med dimma, så att den når upp till 100 %, och något lägre mitt på dagen, ned till omkring 70 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Grodorna behöver ingen vattenskål, eftersom fuktigheten täcker deras behov.
LJUS OCH UVB	Grodan är dagaktiv och lever i skugga under skogens lövtak. Det finns ingen dokumentation för att arten behöver UVB när fodret pudras med D3-vitamin, men svag UVB-belysning (Ferguson-zon 1) kan användas utan skada.
UTFODRING	*O. lehmanni* äter bara levande, små leddjur. Basfödan är vinglösa bananflugor, och arten är stor nog att också ta de större *Drosophila hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*O. lehmanni* är dagaktiv och lugn, men hanarna är territoriella och kväker från fasta platser. Håll arten parvis. Hanar är mycket aggressiva mot varandra och trycker ned varandra, och den underlägsna hanen kan dö av stress.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/oophaga-lehmanni