herpy

PILGIFTSGRODOR

Strawberry Poison Frog

Oophaga pumilio

Oophaga pumilio är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-24 mm från Centralamerikas regnskogar, känd för sina många färgformer och en ovanlig yngelvård: honan matar varje grodyngel med obefruktade ägg. Den är fascinerande att följa, men kräver erfarenhet, små foderdjur och tålamod.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates pumilio*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-24 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**10 mån.**
Ägg per läggning	**3-5**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**42-56 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par eller en liten grupp på upp till fyra djur behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd). Fler djur kräver mer golvyta.

TEMPERATUR
På dagen ska det vara 22-26 °C, gärna omkring 24 °C, och på natten 19-21 °C. Temperaturer under 18 °C eller över 32 °C under längre tid kan vara dödliga.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska vara hög, 70-100 %. Sikta på 70-80 % på dagen och upp mot 100 % på natten, till exempel genom att spraya fyra gånger om dagen med en automatisk anläggning. En regnanläggning med timer är därför en stor fördel.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
En låg vattenskål räcker, men vattnet får högst vara ca ¾ av grodans höjd, i praktiken under 1 cm, för arten simmar dåligt och kan drunkna. Använd en platt skål med en ramp av sten eller mossa och byt vattnet ofta.

LJUS OCH UVB
Ge 12 timmars ljus per dag, så att växterna trivs. En LED-växtlampa som inte värmer mycket är ett bra val.

UTFODRING
Oophaga pumilio behöver mycket små foderdjur, högst ca 2 mm. Små, flygoförmögna *Drosophila melanogaster* och hoppstjärtar är grundfodret, kompletterat med bladlöss, termiter och andra små foderdjur.

BETEENDE OCH HANTERING
Oophaga pumilio är dagaktiv, djärv och nyfiken och rör sig mycket i lövet. Hanarna försvarar revir med ett surrande, syrsliknande lockläte och kan slåss med andra hanar. Honorna väljer typiskt den närmaste lockande hanen.

NATURLIG UTBREDNING
Nicaragua, Costa Rica och Panama.